

❖ هدف از این پمفلت این است که به شما

درمورد عمل جراحی ختنه و آنچه که


باید قبل و بعد از عمل انجام دهید

اطلاعاتی بدهد

❖ .ختنه چیست؟

❖ ختنه نوعی عمل جراحی است که در آن

پوست روی ختنه گاه برداشته می شود



❖ چه اقداماتی قبل عمل لازم است ؟

کودک شما معمولا 4-8 ساعت قبل عمل

چیزی از راه دهان نخواهد خورد.

نوع بیهوشی که داده می شود از نوع

بیهوشی عمومی است

❖ .بعد عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟

❖ تا سه ساعت بعد عمل چیزی از راه

دهان داده نخواهد نشد.

معمولا در صورت نداشتن

مشکل خاص بعد از ظهر روز عمل بعد از

ادرار کردن و نداشتن استفراغ و

خونریزی مرخص می باشد ..

❖ چطور می توانم از کودکم در منزل

مراقبت کنم؟

❖ در صورت داشتن پانسمان برای برداشتن

پانسمان بعد از سه روز کودک را در لگن

آب ولرم به مدت 15 دقیقه بنشانید هر

جای پانسمان کنده شد با قیچی ببرید و

محلهای چسبیده را در شستشوهای

بعدی بردارید.

❖ محل برش در ابتدا قرمز و حساس و

متورم بوده و در عرض 3 روز این

حساسیت کاهش می یابد

❖ محل ختنه را بعد برداشتن پانسمان با آب

ولرم ساده (بدون صابون) روزی دو بار

شسته و بعد پماد تتراسایکلین یا وازلین

روی محل بزنید. اینکار باعث نرمی و

تسکین درد ختنه می شود

❖ جهت تسکین درد طبق دستور پزشک از

استامینوفن هر 4-6 ساعت استفاده

کنید.

روز بعد عمل کودک خود را به حمام

ببرید



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

بیمارستان ولی عصر (عج) اقلید

ختنه

تهیه کننده: روح الله فارسی کارشناس ارشد پرستاری

بازنگری شده: تابستان 1404

منبع: پرستاری داخلی جراحی برونر ثودارت

کد سند: PE/P-PH/044/2

✚ محل ختنه دچار تورم شدید و خروج

چرک باشد

✚ تبدار شده باشد

✚ به نظر بی حال و مریض بیاید

✚ از پوشانیدن شورت یا شلوار در روزهای

اول اجتناب کنید (از دامن استفاده کنید

).

✚ در صورت استفاده از پوشک باید به

صورت شل بسته شود یا از یک سایز

بزرگتر پوشک استفاده کنید .

✚ بخیه ها قابل جذب بوده و در عرض 10-

7 روز اتفاق می افتد

❖ کی به پزشک مراجعه کنم؟

در این موارد باید فوراً به پزشک مراجعه کنید:

✚ اگر کودک ادرار قطره قطره داشته

باشد

✚ خونریزی از محل ختنه به صورت چکه

چکه داشته باشد