



بیمارستان ولی عصر اقلید

عمل هیدروسل

تهیه کننده: زهرا زینلی کارشناس ارشد پرستاری

بازنگری شده: تابستان 1404

منبع: پرستاری داخلی جراحی گوارش

کد سند: PE/P-PH/052/3

تعریف

تجمع مایع در اطراف بیضه که توسط یکی از پوشش های بیضه ترشح میشود، هیدروسل نامیده میشود. هیدروسل می تواند یک طرفه یا دوطرفه باشد و معمولاً بدون درد است ولی فرد مبتلا باید جهت بررسی از نظر مواردی چون سرطان بیضه به پزشک مراجعه نماید. در اکثر موارد علت خاصی نمی توان یافت. در بالغین معمولاً یک بیماری خوش خیم است و در 10 درصد موارد به علت سرطان، ضربه، التهاب یا عفونت کیسه بیضه) اپیدیدیمیت یا ارکیت) بوجود می آید. (اپیدیدیم به لوله های ظریف و پرپیچ و خمی که پشت بیضه ها قرار دارند می گویند)

تشخیص:

معاینه بالینی، سونوگرافی، آزمایش عبور نور در مردی که با تورم کیسه بیضه مراجعه کرده است باید تشخیصهای افتراقی زیر مطرح شوند:

- عفونت بیضه
- سرطان بیضه
- تورم جدار کیسه بیضه
- فتق (در بسیاری مواقع هیدروسل با فتق کشاله ران همراه است)

درمان:

اساس درمان عبارت است از جراحی (هیدروسلکتومی: عمل جراحی هیدروسل معمولاً ساده و کم عارضه میباشد) البته احتمال عفونت پس از عمل، صدمه به عروق اسپرمی و اختلال در باروری و نیز عوارض بیهوشی محتمل است) نیاز به بستری طولانی ندارد و با بی حسی موضعی و بیهوشی عمومی قابل انجام می دهد. کشیدن مایع هیدروسل در بچه ها به دلیل خطر عفونت به هیچ وجه نباید انجام شود

- بزرگ شدن بیضه، درد، قرمزی پوست کیسه بیضه، احساس سنگینی
- در پسر بچه ها معمولا هیدروسل در طی یکسال به طور خود به خود محو می شود. اگر پس از یکسال از بین نرفت و یا به بزرگ شدن ادامه داد، نیاز به جراحی خواهد داشت
- در بزرگسالان نیز اغلب هیدروسل خودبه خود از بین می رود و زمانی نیاز به درمان پیدا می کند که آنقدر بزرگ شود که غیر قابل تحمل شده یا بد شکل باشد.
- بردارید

بعد از عمل جراحی:

معمولا بسته به نظر پزشک شما فقط دو یا چند روز در بیمارستان بستری می شوید واز آنجایی که در عمل جراحی هیچ گونه برشی روی پوست ایجاد نمی شود درد های بعد عمل به مقدار قابل توجهی کم تر از عمل های دیگر است و بعد عمل یک سوند در مثانه قرار داده میشود تا ادرار بیمار تخلیه شود و خونریزی نیز تحت کنترل تیم پزشکی باشد.

مراقبتهای بعد از عمل :

- حدود 8ساعت پس از عمل می توانید به تدریج از مایعات استفاده کنید. در صورت دریافت بیهوشی عمومی بهتر است غذای معمولی را از روز بعد شروع کنید

- بهتر است تا 48ساعت اول بعد از عمل فعالیت محدود داشته و فقط در موارد ضروری (مثلا برای رفتن به دستشویی) از جای خود حرکت کنید و در صورتیکه از کمر بی حسی گرفته اید تا 12ساعت بصورت خوابیده باشید تا از سردرد و کمر درد جلوگیری شود
- دوروز بعد میتوانید پانسمان پس از عمل را واز این زمان به بعد،معمولا نیاز به پانسمان وجود ندارد مگر اینکه به علت مشکل خاصی،پزشکگ آن را توصیه کند
- در صورت تب بیش از 38درجه به پزشک معالج مراجعه کند
- دو روز پس از عمل آن میتوان به حمام رفت
- علاوهخ بر مسکن تا زمانی که سوند دارید و تا 24ساعت پس از آن،مصرف آنتی بیوتیک الزامی است
- استفاده از کیسه یخ بروی موضع در 24ساعت اول پس از عمل،تورم را کاهش می دهد
- پانسمان را دو روز بعد از عمل بردارید واگر ترشحاتی وجود نداشته باشد پس از آن دیگر نیاز به پانسمان ندارید